

## **INTERVENCIÓN DE LARINGOSCOPIA DIRECTA Y/O MICROCIRUGÍA LARÍNGEA**

La laringoscopia directa es un procedimiento que se utiliza en ocasiones como diagnóstico para conocer cuál es la enfermedad que está afectando a las cuerdas vocales o también para tratamiento de algunos problemas de éstas, como pueden ser pólipos, nódulos, y tumores, entre otros.

Es un procedimiento otorrinolaringológico muy comúnmente realizado y está considerado como uno de los más seguros de la especialidad. Al margen de las complicaciones propias de la anestesia, los riesgos de esta intervención son poco frecuentes.

Entre ellos está el daño a los dientes superiores, incluyendo pérdida de alguna pieza dental, dado que el instrumento que se utiliza para visualizar las cuerdas vocales se coloca sobre estos (por ello se toman medidas de precaución mediante el uso de protectores dentales).

También pueden ocurrir pequeñas erosiones en la base de la lengua que producirán una molestia postoperatoria y/o algo de sangrado, que generalmente se resuelve en unas pocas horas.

Son de especial dificultad para la laringoscopia directa, las personas con cuello corto y grueso o las personas que padecen artrosis cervical por la imposibilidad de extender el cuello; en estos casos, a veces el procedimiento resulta imposible.

También como posibilidad, aunque sea remota, podría ocurrir empeoramiento en la calidad de la voz o incluso disfonía (ronquera). Este raro problema depende fundamentalmente del tipo de enfermedad que sufran sus cuerdas vocales.

Existe una posibilidad muy remota de obstrucción de la vía aérea tras la cirugía. En este caso se precisaría una traqueotomía (apertura de la tráquea al cuello) de urgencia para resolver dicho problema.

Si existen opciones alternativas a la intervención, su otorrinolaringólogo se las explicará personalmente.

Si antes de firmar este cuestionario desea más información, no dude en solicitarla, preguntando directamente al médico tratante o en la consulta de pre-admisión.